NOTA DE PRENSA

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Los dentistas pueden ayudar a detectar nuevos casos de infección por VIH

- ***Hoy, día 1 de Diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA***
- ***Las personas infectadas por el VIH pueden sufrir lesiones características en la cavidad bucal que ayudarían al dentista a detectar la infección***
- ***A pesar de los importantes esfuerzos de las autoridades sanitarias, el VIH sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública mundial***
- ***En 2015, más de un millón de personas fallecieron en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el VIH***

1 de Diciembre de 2016.- El 90% de los pacientes infectados por el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sufren lesiones bucodentales a lo largo de la enfermedad. Estas patologías pueden ser, en muchas ocasiones, las primeras manifestaciones clínicamente detectables del contagio y pueden alertar al dentista sobre la posible presencia de este virus.

Para más información

Colegio Of. Dentistas de León. C/Julio del Campo, 6. www.coeleon.es Tel. 987210000 / Prensa (630 582 204)

El Colegio Oficial de Dentistas de León y el Consejo General de Dentistas, con motivo de la celebración, este 1 de diciembre, del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, recuerdan que el papel del dentista puede ser determinante en la lucha contra las infecciones.

El motivo de la alta incidencia de enfermedades bucodentales en pacientes con VIH radica en su sistema inmunológico. El VIH lo debilita y hace que el enfermo sea más propenso a las infecciones, hongos y bacterias.

*La patología bucal más frecuente entre los enfermos de VIH es la **candidiasis**, provocada por el hongo Cándida y cuyos signos pueden encontrarse en el paladar y dorso de la lengua. También en los bordes laterales de la lengua puede aparecer la leucoplasia vellosa, una lesión blanquecina no removible.*

*Las llamadas **ulceraciones aftosas** recurrentes suelen ser también comunes en personas inmunodeprimidas. Se trata de erosiones o úlceras superficiales, dolorosas y que pueden durar más de ocho o diez días, para reaparecer pasado un tiempo desde el último episodio.*

*Ya en las **encías**, el dentista puede detectar eritema lineal gingival, que se caracteriza por una franja de color rojo intenso a lo largo de la encía marginal y que no está relacionada con la placa bacteriana, así como periodontitis necrotizante, una infección que se caracteriza porque el tejido gingival, el ligamento periodontal o el hueso alveolar presentan necrosis.*

Para más información

Colegio Of. Dentistas de León. C/Julio del Campo, 6. www.coeleon.es Tel. 987210000 / Prensa (630 582 204)

Por su parte, el Sarcoma de Kaposi se inicia como una mancha o placa eritematosa o violácea sin relieve, que se localizan, de forma habitual, en el paladar y la encía. La lesión pasa a convertirse en una masa tumoral de crecimiento rápido.

*El **Día Mundial de la lucha contra el Sida** se celebra cada año el día 1 de diciembre con el objetivo sensibilizar sobre la importancia de la infección por VIH, de sus consecuencias y de la necesidad de incrementar las medidas para frenarla, así como incidir en las garantías de acceso al tratamiento y la no discriminación a las personas que viven con el virus.*

A pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias, la disminución de las nuevas infecciones por el VIH entre las personas adultas se ha estancado. En el último año, más de 1 millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida y más de 36 millones conviven con esta enfermedad.